

Erreger:	Paragonismus Wertesmanii
Beschreibung:	Egel-Erkrankung die zu einer die Tuberkulose imitierenden
Describing.	Lungenerkrankung führt.
Übertragung:	Verzehr roher, eingelegter oder schlecht getrockneter
obortragarig.	Schalentiere.
Pathogenese:	Mit dem Sputum oder Stuhl ausgeschiedenen Eier reifen 2-3 Wochen im Süßwasser heran bevor Mirazidien schlüpfen. Die Mirazidien befallen Schnecken, Larven entwickeln sich, vermehren sich, und verlassen schließlich diese als Zekarien. Die Zekarien penetrieren Krabben oder Flusskrebse. Die Zekarien exzystieren im Verdauungstrakt penetrieren in die Darmwand, in das Peritoneum, wandern in und durch das Zwerchfell in den Pleuraspalt, gelangen in das Lungengewebe, enzystieren dort und entwickeln sich zu hermaproditen adulten Würmern. Die Würmer können sich auch im Gehirn, Leber, Lymphknoten, Haut und Rückenmark entwickeln. Adulte Tiere können 20-25 Jahre persistieren.
Symtomatik, Klinik:	Bei leichten Infektionen werden hauptsächlich die Lungen geschädigt, schwere Infektionen ziehen auch andere Organe in Mitleidenschaft. Symptome einer pulmonalen Infektion entwickeln sich nur langsam und beinhalten Dyspnoe, chronischen Husten, Thoraxschmerzen und Hämoptysen. Röntgenuntersuchungen können diffuse Infiltrate, Knötchen, ringförmige Opazitäten, Kavernenbildung, Lungenabszesse, Pleuraergüsse und Pneumothorax nachweisen. Das klinische Bild erinnert an eine Tuberkulose.
Diagnostik:	Identifizierung der charakteristischen großen operkulierten Eier im Sputum oder Fäzes, serologische Untersuchungen.
Therapie:	Chem. Medikation
Prävention:	Auf Verzehr roher Schalentiere verzichten.
Unterstützende	siehe Link zum Shop: www.boi-frequenz-center.de
Naturheilmittel:	Juglandis Nieren Saft Leber Saft Papaya Seed
Unser spezieller	Energetische Blut- und Haaranalysen aller Erreger.
Service:	Nähere Informationen und Frequenzen auf Nachfrage.
	Wir beraten Sie gerne. Nehmen Sie einfach Kontakt auf: E-Mail: service@carica-deutschland.de